



PlantiCo - Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a,
05-082 Stare Babice
tel. 22/722-90-66

Zakład Hodowlano-Nasienny
Spójnia Nochowo
Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem
tel. 61/283-34-27
www.nasiona-warzyw.pl

Odmiany marki SPÓJNIA

SAŁATA


OWACJA

Odmiana masłowa, bardzo plenna, średnio wczesna, przeznaczona do uprawy polowej. Wysiew marzec – lipiec. Można uprawiać na zbiór jesienny. Bardzo późno tworzy pędy kwiatostanowe. Główka duża, dobrze wypełniona, jasnozielona, zamknięta u podstawy. Długo zachowuje wartość handlową, bardzo smaczna, liście nie gorzknieją. Tolerancyjna na rasy 1-7 i 10-12 mączniaka rzekomego i wobec wirusów. Dojrzałość handlową osiąga po 45-50 dniach od wysadzenia. Zalecana rozstawa 12-16 roślin / m².



MILLY - ELENA

Odmiana masłowa, bardzo plenna, średnio wczesna, przeznaczona do uprawy pod osłonami i w gruncie. Wysiew w szklarni od stycznia, a w gruncie - do połowy maja. Można uprawiać na zbiór jesienny. Główka duża, okrągła lub poprzecznie eliptyczna, o żółtozielonych liściach, zamknięta. Późno wybija w pędy nasienne. Bardzo smaczna, liście nie gorzknieją. Dojrzałość handlową osiąga po ok. 45-47 dniach od wysadzenia. Odporna na niektóre rasy 1-7 i 10-12 mączniaka rzekomego i wirusa mozaiki. Zalecana rozstawa 12-16 roślin / m².



SZANSA

Odmiana masłowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami - jesienią, zimą i wczesną wiosną. Szybko wiąże główki przy krótkim dniu. Wysiew do końca lutego (można też od połowy sierpnia). Rośliny o lekko wzniesionym pokroju co zapobiega zagniwaniu główek. Główka okrągła, średnio zwięzła, o bardzo delikatnej konsystencji liści. Tolerancyjna na niektóre rasy mączniaka rzekomego 1-15. Tolerancyjna wobec temperatury i długości dnia. Dojrzałość handlową osiąga po ok. 40 dniach od wysadzenia. Zalecana rozstawa - do 20 roślin / m².



NOCHOWSKA

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, gruntowa. Przeznaczona na zbiór późnowiosenny i letni. Wytrzymała na wysokie temperatury, bardzo smaczna. Tworzy dość duże, twarde, kuliste główki. Liście duże, żółtawozielone, delikatne.

Przedstawiciele firmy:

region południowej, centralnej i wschodniej Polski
region północnej, środkowej i zachodniej Polski

tel. 508-191-757
tel. 508-191-758

ZINA

Odmiana masłowa, średnio wczesna. Tworzy główki średnio duże, średnio zwężłe, zamknięte. Liście średniej wielkości, jasnozielone ze słabym połyskiem, kruche, gładkie, ze słabo pofałdowanymi brzegami. Odmiana ta zimuje w gruncie bez osłon. ZINA daje wczesnowiosenny plon główek, który pod względem terminu porównywalny jest do odmian uprawianych w tunelach foliowych. Dość dobra odporność na choroby. Odmiana nadaje się również do uprawy w gruncie z siewu wczesnowiosennego.



FLAMENCO

Odmiana do produkcji na wiosnę, lato i jesień. Tworzy duże, bujne liście o dębowym kształcie i czerwonym kolorze. Odmiana odporna na kilka ras mączniaka rzekomego. W miarę rozwijania się liści można je stopniowo obrywać do spożycia w postaci różnego rodzaju sałatek, surówek, kanapek, do dekoracji.



LARSEN

Odmiana lodowa, średnio wczesna, do całorocznej uprawy w gruncie. Tworzy duże zamknięte kruche i smaczne główki. Odporna na wybijanie w pędy nasienne i kilka ras mączniaka. Okres od siewu do zbioru wynosi 80 dni. Doskonała do bezpośredniej konsumpcji, przyrządzania surówek, do dekoracji. Wymaga gleby żyznej, wilgotnej i przepuszczalnej.



Uprawa gruntowa (odmiana : Nochowska, Zina, Owacja, Flamenco, Larsen)

• **uprawa z rozsady:** wysiew do pojemników na ok. 6 tygodni przed planowanym posadzeniem do gruntu. Optymalna temperatura 15-20°C. Po wejściu roślin temperaturę obniżyć do 12 - 13°C w nocy i 15°C w dzień. Przepikować rozsadę do multiplatów lub do doniczek ziemnych o średnicy 5 cm. Po przerośnięciu pierwszych korzeni na zewnątrz pojemników należy rozsadę wysadzać na miejsce stałe. Rozstawa ok. 40 x 25 cm.

• **uprawa z siewu:** wysiew nasion od wczesnej wiosny (gdy warunki klimatyczne na to pozwalają). Gleba powinna być pulchna, dobrze wyrównana, wolna od brył; najlepiej po jesiennej, głębokiej orce i wiosennej włóce, kultywatorze czy bronie. Rozstawa rzędów 30 - 40 cm. W fazie 3 - 4 liści wykonać przerywkę na odległość 20 - 30 cm. Sałatę na przeziębienie (odm. ZINA) wysiewać od połowy do końca września, w podłoże głęboko uprawione, przepuszczalne i osłonięte od wiatrów. Termin ten jest precyzyjny ze względu na zmienne warunki klimatyczne w poszczególnych latach.

Odmiana	Liczba dni od posadzenia do zbioru	Miejsce polecane do uprawy	Masa główki (g)	Kolor	Obsada (szt. m ²)	Termin wysiewu
Szansa	ok. 40	osłony	260-300	jasnozielony	ok. 20	II-III VIII-IX
Milly-Elena	ok. 47 - osłony ok. 45 - grunt	osłony grunt	370-520	jasnozielony z żółtawym odcieniem	12-16	I-III-osłony III-IV-grunt VII-VIII-grunt
Owacja	ok. 50 - osłony ok. 45 - grunt	grunt	400-550	jasnozielony	12-16	III-IV VII-VIII
Nochowska	ok. 47 - osłony ok. 42 - grunt	grunt	300-350	żółtawozielony	16-18	III-IV VII-VIII
Zina	ok. 40	grunt	210-230	zielony	ok. 20	od połowy VIII do połowy X

Wszystkie odmiany marki SPÓJNIA nadają się do integrowanej uprawy.