

Sałata | Lettuce

Lactuca sativa L.

SAŁATA MASŁOWA | BUTTERHEAD LETTUCE



plantico®



BONA

- Wczesna, do średniowczesnej, plenna.
- Od wysiewu do zbioru główek 75-90 dni.
- Dobra struktura plonu.
- Główki duże, okrągłe, ściśle o masie 350-500 g.
- Liście jasne, średnio pęcherzykowate.
- Brzeg liścia prawie gładki.
- Przeznaczona do uprawy polowej we wszystkich terminach.
- Polecana do uprawy wczesnowiosennej w tunelach.
- Równomiernie osiąga wielkość handlową.
- Tolerancyjna na wirus CMV.
- Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Późno wybija w pędy kwiatostanowe.
- Wykazuje małe skłonności do gromadzenia azotanów (857 mg NaNO_3/kg świeżej masy).
- *Early to medium early.*
- *75-90 days from sowing to harvest.*
- *Good yield structure.*
- *Circular, large, compact head, 350-500 g weight.*
- *Leaves bright, medium blistering.*
- *Recommended for early growing in the plastic tunnels and spring and autumn for open field.*
- *Tolerant to CMV virus.*
- *Resistant to bad weather conditions.*
- *Late bolting.*
- *Low tendency to accumulate nitrates.*

ISMINA

- Odmiana masłowa, wczesna.
- Przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej.
- Główki szerokoeliptyczne, otwarte.
- Jasnozielone, silnie pęcherzykowate liście.
- Liść wyjątkowo dekoracyjny, bardzo smaczny, chrupiący słodki.
- *Butterhead, early variety.*
- *Designed for spring and autumn growing.*
- *Broad elliptic heads, open.*
- *Light green leaves, strong blistering.*
- *Leaf very decorative, very tasty, crunchy and sweet.*

KRÓLOWA MAJOWYCH

- Odmiana polecana do wczesnej uprawy w polu i późniejszej pod osłonami (wymaga silnego wietrzenia).
- Dość odporna na mącznika rzekomego i średnio odporna na szarą pleśń.
- Tworzy duże, zamknięte główki o żółtawozielonych, jędrnych liściach.
- Okres od posadzenia rozsady do zbioru główek wynosi 30-40 dni.
- *Recommended for early growing in the field and later under cover (requires a strong air circulation).*
- *Resistant to downy mildew and tolerant to gray mould.*
- *Head large, closed with yellow green, firm leaves.*
- *30-40 days from transplanting to harvest.*

MARTA ZIELONA

- Odmiana wczesna, przydatna do wczesnowiosennej, wiosennej i jesiennej uprawy pod folią oraz w polu bez osłon.
- Bardzo plenna, o dobrej strukturze plonu.
- Odnacza się bardzo dużym udziałem pierwszego zbioru w plonie ogólnym.
- Liście zielone, lekko pomarszczone, delikatne.
- Główna bardzo duża, twarda, kulisto-splaszczona.
- Wysoka wytrzymałość na silne i długotrwałe nasłonecznienie i wysoką temperaturę.
- Odporna na większość ras mączniaka rzekomego występujących w Polsce: rasy NL 1-6, 13-15.
- Zalecana rozstawa - 25 x 25 cm, tj. około 16 roślin/m².
- Nasiona białe.
- *Early variety, suitable for early spring and autumn production under cover and open field.*
- *Good yield structure.*
- *Leaves are green, delicate and slightly wrinkled.*
- *Large head, closed, transverse elliptic.*
- *Adapted to sunlight and high temperature conditions.*
- *Resistant to races of downy mildew: race NL 1-6, 13-15.*
- *Recommended spacing - 25 x 25 cm, approximately 16 plants/m².*
- *White seeds.*



MARYSIENKA

- Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy pod folią oraz w polu, w okresie wczesnowiosennym i jesiennym.
- Liście jasnozielone do zielonych, prawie gładkie do lekko pęcherzykowatych, delikatne.
- Główna ładnie zamknięta, okrągła, średnio zwężała.
- Odmiana odporna na większość ras mączniaka rzekomego występujących w Polsce: rasy NL 1-7+9-11+13-15.
- Bardzo wytrzymała na silne nasłonecznienie, wysoką temperaturę.
- Zalecana rozstawa - 25 x 25 cm, tj. około 16 roślin/m².
- Nasiona białe.
- *Early variety, suitable for early spring and autumn production under cover and open field.*
- *Light green leaves, delicate; very weak blistering.*
- *Closed head, circular, medium compact.*
- *Adapted to sunlight and high temperature conditions.*
- *Resistant to races of downy mildew: race NL 1-7+9-11+13-15.*
- *The recommended spacing - 25 x 25 cm, approximately 16 plants/m².*
- *White seeds.*

MICHALINA

- Odmiana masłowa, wczesna do średniowczesnej.
- 65-80 dni od wysiewu do zbioru główek.
- Plenna o dobrej strukturze plonu.
- Główki duże, kulisto-splaszczone, żółtozielone, o masie 350-400 g.
- Do uprawy letniej w gruncie, nadaje się również do uprawy wczesnej w gruncie i pod folią nie ogrzewaną.
- Równomiernie osiąga wielkość handlową.
- Tolerancyjna na wirus CMV, tolerancyjna na suszę.
- Mała skłonność do gromadzenia azotanów (899 mg NaNO_3/kg świeżej masy).
- *Butterhead variety, early to medium early.*
- *65-80 days from sowing to harvest.*
- *Good yield structure.*
- *Heads large, transverse elliptic, yellow green, 350-400 g weight.*
- *Suitable for early production under cover and open field and summer production for open field.*
- *Tolerant to CMV virus, tolerant to drought.*
- *Low tendency to accumulate nitrates.*

MIRA

- Odmiana masłowa, dość wczesna, plenna, o dobrej strukturze plonu.
- Główki duże, okrągłe, ściśle o masie 300-400 g, barwy czerwono-zielonej.
- Przeznaczona do wczesnej uprawy polowej.
- Odporna na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Późno wybija w pędy kwiatostanowe.
- Mała skłonność do gromadzenia azotanów (764 mg NaNO₃/kg świeżej masy).
- Od wysiewu do zbioru główek 75-90 dni.

- *Butterhead variety, quite early, good yield structure.*
- *Head large, circular, close, red-green, 300-400 g weight.*
- *Designed for early open field production.*
- *Resistant to diseases and bad weather conditions.*
- *Late bolting.*
- *Low tendency to accumulate nitrates.*
- *75-90 days from sowing to harvest.*

MODESTA

- Sałata gruntowa średniowczesna.
- Dojrzałość konsumpcyjna po ok. 55 dniach od wysadzenia rozsady.
- Przeznaczona do uprawy wiosennej w gruncie i tunelu foliowym.
- Główka eliptycznie wydłużona, ściśła i dobrze zamknięta około 1000 g.
- Kształtem przypomina sałaty rzymskie.
- Liście jasnozielone z silnym nalotem woskowym, bez połysku.
- Liść pęcherzykowaty, o konsystencji krucho-masłowej, brzeg prawie gładki.

- *Medium early variety.*
- *55 days from transplanting to harvest.*
- *For spring production under cover and open field.*
- *Broad elliptic head, well closed, 1000 g weight.*
- *Head shape similar to cos lettuces.*
- *Light green leaves with a strong waxy coating, without gloss.*
- *Leaf: medium blistering, absent of very weak undulations of margin.*

NAWOJKA

- Wczesna odmiana gruntowa.
- Liść cienki, delikatny, silnie pęcherzykowaty.
- Główka otwarta, zwężła, szerokoeliptyczna, o masie 250-350 g.
- Przeznaczona do uprawy wiosennej, nadaje się do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych.

- *Early variety for open field.*
- *Leaf: delicate, thin, strong blistering.*
- *Open head, compact, broad elliptic, 250-350 g weight.*
- *For spring production under cover and open field.*



REGINA ZIELONA

- Odmiana polowa, przydatna do uprawy od wczesnej wiosny do jesieni, szczególnie latem.
- Liście zielone, bez antocyjanu, o słabym połysku.
- Główka bardzo duża, twarda, zamknięta.
- Długo pozostaje w dojrzałości użytkowej, nie wybijając w pędy kwiatostanowe.
- Odmiana odporna na większość ras mączniaka rzekomego występujących w Polsce: rasy NL 1-7+10-13.
- Zalecana rozstawa 25 x 30 cm.
- Nasiona czarne.

- *For spring, summer and autumn production in open field.*
- *Green leaves with faint sheen.*
- *Head very large, compact and closed.*
- *Very slow bolting.*
- *Resistant to races of downy mildew NL 1-7+10-13.*
- *The recommended planting space is 25 x 30 cm.*
- *Black seeds.*

SABA

- Odmiana polowa do uprawy wiosennej, letniej i jesiennej.
- Charakteryzuje się intensywnym wzrostem.
- Bardzo plenna, o dobrej strukturze plonu.
- Zabarwienie liści jasnozielone, bez antocyjanu, o słabym połysku.
- Główka bardzo duża, twarda, zamknięta, ciężka i zwężła.
- W strukturze plonu bardzo duży udział główek o masie większej niż 350 g.
- Główka długo pozostaje w dojrzałości użytkowej, nie wybijając w pędy kwiatostanowe.
- Odporna na większość ras mączniaka rzekomego występujących w Polsce: rasy NL 1-7+10-13.
- Zalecana rozstawa 25 x 30 cm.
- Nasiona białe.

- *For spring, summer and autumn production in open field.*
- *Intensive growth.*
- *Good yield structure.*
- *Light green leaves, with light sheen.*
- *Head very large, hard, closed, heavy and compact.*
- *Head approximately 350 g.*
- *Very slow bolting.*
- *Resistant to races of downy mildew: race NL 1-7+10-13.*
- *The recommended planting space is 25 x 30 cm.*
- *White seeds.*

SALAITY KRUCHE „TYP LODOWY” | ICEBERG LETTUCE

BAKATA

- Soczysto zielone zabarwienie liści zewnętrznych i główek.
- Liść prawie gładki, kruchy, z brzegiem ładnie powcinanym.
- Główki zwarte, zamknięte, o masie powyżej 1000 g.
- Pełną dojrzałość użytkową uzyskuje po 35-40 dniach od posadzenia - w tunelu i po 45-50 dniach - w polu.
- Długo utrzymuje dojrzałość konsumpcyjną.
- Polecana do uprawy całorocznej - wczesnowiosennej (w tunelach nie ogrzewanych), wiosennej, letniej i jesiennej w polu bez osłon.
- Zalecana rozstawa 30 x 40 cm.

- *Green leaves and heads.*
- *Leaf nearly smooth, crispy, with the undulated margin.*
- *Head compact, closed, more than 1000 g weight.*
- *35-40 days from transplanting to harvest in the tunnel; 45-50 days - in the field.*
- *Very slow bolting.*
- *Recommended for early spring (in plastic tunnels), spring, summer and autumn production in the open field without covers.*
- *Recommended planting space 30 x 40 cm.*

CARMINA

- Polecana do uprawy całorocznej (wczesną wiosną w tunelach, od wiosny do jesieni w polu).
- Barwa liścia - jasnozielona, z wyraźnym odcieniem antocyjanowym na brzegach liści zewnętrznych.
- Liście kruche, o gładkiej i lśniącej powierzchni.
- Brzeg liścia ładnie powcinany.
- Główki duże, zwarte, o masie powyżej 1000 g.
- Pełną dojrzałość użytkową uzyskuje po 40-45 dniach od posadzenia - w tunelu i po 50-55 dniach - w polu.
- Przydatna również do uprawy letniej - jest odporna na wybijanie pędów kwiatostanowych w wysokiej temperaturze oraz niesprzyjające warunki i zagniewanie dolnych liści.
- Odmiana dekoracyjna, bardzo smaczna, nadaje się do transportu.
- Zalecana rozstawa 30 x 40 cm.

- *Recommended for early spring production in the tunnels and from spring to autumn in the open field.*
- *Light green leaves, with a distinct anthocyanin color at the edges of the outer leaves.*
- *Brittle leaves, with a smooth and shiny surface.*
- *Leaves with undulated margin.*
- *Heads large, compact, more than 1000 g weight.*
- *40-45 days from transplanting to harvest in the tunnel; 50-55 days - in the field.*
- *Very slow bolting, adapted to bad weather conditions.*
- *Decorative variety, very tasty, suitable for transport.*
- *Recommended planting space 30 x 40 cm.*



JULECZKA

- Główki zwarte, zamknięte, o masie powyżej 1000 g.
- Jasnozielone zabarwienie liści zewnętrznych główki.
- Liść prawie gładki, kruchy, z brzegiem ładnie powcinanym.
- Pełną dojrzałość użytkową uzyskuje po 30-35 dniach od posadzenia - w tunelu i po 40-45 dniach - w polu.
- Długo utrzymuje dojrzałość konsumpcyjną.
- Polecana do uprawy całorocznej - wczesnowiosennej (w tunelach nie ogrzewanych), wiosennej, letniej i jesiennej w polu bez osłon.
- Zalecana rozstawa 30 x 40 cm.

- Compact heads, closed, more than 1000 g weight.
- Light green leaves.
- Leaves smooth, shiny surface.
- Leaves with undulated margin.
- 30-35 days from transplanting to harvest in the tunnel; 40-45 days - in the field.
- Very slow bolting.
- Recommended for early spring production (in the plastic tunnels) and from spring, summer and autumn growing in the open field.
- Recommended planting space 30 x 40 cm.

KINGA

- Odmiana średniowczesna.
- Główna duża, twarda, spłaszczona o masie 750-1200 g, soczysta i krucha.
- Liście grube, intensywnie zielone, silnie pęcherzykowane, o pofalowanym brzegu.
- Nadaje się do uprawy we wszystkich terminach, również wczesnowiosennych w nieogrzanych tunelach.

- Medium early variety.
- Large head, compact, transverse narrow elliptic, 750-1200 g weight, crispy.
- Thick leaves, intensive green with undulated margin and strong blisters.
- For all production period - also for early spring growing under covers.



KWIRYNA

- Sałata gruntowa krucha, wczesna.
- Do uprawy wiosennej w nieogrzewanym tunelu foliowym oraz do uprawy gruntowej.
- Dojrzałość konsumpcyjną osiąga po 45-50 dniach od wysadzenia rozsady.
- Główna średniej wielkości o masie 600-650 g, lekko spłaszczona (poprzecznie eliptyczna).
- Liść jasnozielony z lekkim połyskiem, słabo pęcherzykowaty, prawie gładki, brzeg średnio falowany.
- Wysokie walory smakowe, słodka, soczysta, bez goryczki.

- Early variety.
- For spring production under covers and open field.
- 45-50 days from transplanting harvest.
- Head of medium size, 600-650 g weight, transverse broad elliptic.
- Light green leaves with a slight sheen, weak blistering and undulation of margin.
- Taste, sweet without bitterness.

LUDWINA

- Odmiana gruntowa krucha, średniowczesna.
- Główna średniej wielkości, jasna, ściśła o średniej masie 600-900 g.
- Brzeg liścia silnie falowany.
- Delikatna w smaku, bardzo soczysta bez goryczki.
- Średnia skłonność do wybijania w pędy kwiatostanowe.
- Nie gromadzi azotanów.
- Przeznaczona do uprawy wiosennej, polecana do uprawy latem.

- Medium early variety.
- Medium size head, bright, compact with an average weight of 600-900 g.
- Strong undulation of leaf margin.
- Delicate in flavor without bitterness.
- Medium bolting.
- Do not collect nitrates.
- For spring and summer production.

SAŁATA RZYMSKA | COS TYPE LETTUCE

LIWIA

- Odmiana średniopóźna o pokroju wzniesionym.
- Główna eliptyczna.
- Liście zewnętrzne skórzaste silnie nawoskowane, główka duża, jasna, bardzo smaczna, soczysta i słodka, bez nalotu woskowego.
- Średnia masa główki bez liści zewnętrznych 750-1000 g.
- Słabo porażana przez choroby grzybowe.

- Medium late variety, erect type.
- Head elliptic, big, bright, very tasty and sweet, without the wax.
- The average weight of the head without the outer leaves 750-1000 g
- Tolerant to fungal diseases.

DO UPRAWY SZKLARNIOWEJ | GREENHOUSE LETTUCE

ANIELKA

- Odmiana szklarniowa, szczególnie przydatna do uprawy na zbiór w styczniu/lutym.
- Wyróżnia się wczesnością plonowania.
- Dobrze przrasta w warunkach niższego natężenia światła w okresie zimowym.
- Liście lekko pomarszczone, jasnozielonożółte z silnym połyskiem.
- Główki zamknięte, lekko owalne, średnio zwężęte.
- Duży udział główek handlowych w plonie ogólnym.
- Odmiana odporna na rasy mączniaka rzekomego NL 1-7, 9-15.
- Nie wykazuje skłonności do gromadzenia azotanów.
- Zalecana rozstawa 20 x 20 cm, tj. około 25 roślin na m².

- For greenhouse production, especially useful for harvesting in January / February.
- Early variety.
- Grows well despite of lower light intensity during the winter.
- Leaves slightly wrinkled, light green with a high shine.
- Closed head, medium compact.
- A large share of commercial heads in total yield.
- Resistant to downy mildew races NL 1-7, 9-15.
- Very low tendency to accumulate nitrates.
- Recommended spacing 20 x 20 cm, 25 plants/m².

ATENA

- Uniwersalna odmiana szklarniowa.
- Do zbioru wczesnozimowego, zimowego i późnozimowego.
- Przystosowana do uprawy w warunkach niższego natężenia światła i obniżonej temperatury.
- Wyróżnia się z pośród innych odmian wczesnością plonowania
- Pierwsze główki handlowe o masie ponad 150 g osiąga w okresie 30 dni od posadzenia.
- Plon bardzo duży wyrównany, 95-100% plonu handlowego w plonie ogólnym.
- Główki kulisto owalne, duże, ściśłe, twarde, zamknięte.
- Liście ciemnozielone, gładkiej powierzchni, delikatne.
- Wyróżnia się zmniejszoną tendencją do kumulacji azotanów.
- Odporna na mączniaka rzekomego sałaty NL 1-6, 9, 11-14.
- Zalecana rozstawa 20 x 20 cm, tj. około 25 roślin na m².

- Universal greenhouse variety.
- For early winter, winter and late winter production.
- Suitable for production under lower light intensity and low temperature.
- 30 days from transplanting to first harvest.
- 95-100% of marketable yield in total yield.
- Large, closed and compact heads.
- Dark green leaves with smooth surface, delicate.
- Reduced tendency to accumulation of nitrates.
- Resistant to downy mildew NL 1-6, 9, 11-14.
- The recommended spacing 20 x 20 cm, 25 plants per m².

SALAŁA – SZPARAGOWA | ASPARAGUS TYPE

PURPURAT

- Główną częścią jadalną jest gruba i soczysta łodyga.
- Łodyga długości około 40 cm z czerwonawą skórką i białą zielonym mięszem.
- Wytwarza bardzo dekoracyjny liść koloru wiśniowego z silnym połyskiem.
- Przeznaczona do wiosennej i letniej uprawy w polu.
- W wysokiej temperaturze pędy drewnieją, dlatego zalecany jest jak najwcześniejszy wysiew (do gruntu w kwietniu lub do inspektu w połowie marca).
- Dojrzałość konsumpcyjną osiąga po około 50 dniach od posadzenia rozsady.

- The main edible part - thick and tasty stem.
- Stem - approximately 40 cm height, reddish skin and white green flesh.
- Very decorative and cherry color leaves with high gloss.
- Suitable for spring and summer growing in the field.
- At high temperatures makes woody stems, therefore the earliest sowing is recommended (to the ground in April or under cover in mid-March)
- 50 days from transplanting to harvest.

Odmiana	Ilość dni od wysadzenia do zbioru	Produkcja w okresie				Główka		Uprawa	Rozstawa (cm)	Uwagi
		Wczesna wiosna	Wiosna	Lato	Jesień	Waga (g)	Liście			
							Kolor			
Salata głowiasta masłowa										
Bona	35-45	***	***	***	**	350-500	żółto-zielony	w gruncie / pod osłony	35x30	Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, nie gromadzi azotanów. Tolerancyjna na CMV, odporna na LMV.
Ismina	40-50	***	***	*	**	250-400	jasnożółto-zielone	w gruncie / pod osłony	40x20	Bardzo smaczna
Królowa Majowych	35-45	***	***	-	***	250	żółto-zielony	w gruncie / pod osłony	35x30	Średnioodporna na szarą pleśń
Marta Zielona	35-45	***	**	-	***	300-350	zielony	w gruncie / pod osłony	25x30	Odporna na wysokie nasłonecznienie i temperaturę
Marysińska	35-45	***	***	-	***	350	jasno-zielony	w gruncie / pod osłony	25x30	Odporna na wysokie nasłonecznienie i temperaturę
Michalina	40-45	**	***	**	-	350-400	żółto-zielony	w gruncie / pod osłony	35x30	Tolerancyjna na suszę, nie gromadzi azotanów. Tolerancyjna na CMV
Mira	45-50	***	***	***	-	300-400	ciemnowiśniowo-zielony	w gruncie / pod osłony	35x30	Odporna na wybijanie w pędy nasienne, nie gromadzi azotanów
Modesta	50-55	***	**	-	**	1000	matowo-zielony	w gruncie / pod osłony	35x30	Kształtem przypomina sałaty rzymskie, wysokie walory smakowe
Nawojka	35-40	***	***	-	**	250-350	zielony	w gruncie / pod osłony	25x30	Bardzo smaczna
Regina Zielona	45-50	-	**	***	***	350-450	zielony	w gruncie	35x30	Odporna na wybijanie w pędy nasienne
Saba	45-50	-	**	***	***	350-450	jasno-zielony	w gruncie / pod osłony	35x30	Odporna na wybijanie w pędy nasienne
Salata głowiasta krucha - lodowa										
Bakata	45-50	**	***	**	***	>1000	zielony	w gruncie / pod osłony	40x30	Odporna na wybijanie w pędy nasienne
Carmina	50-55	**	***	**	***	>1000	jasnozielony z odcieniem antocyjanowym	w gruncie / pod osłony	40x30	Oryginalny wygląd
Juleczka	40-45	**	***	**	**	>1000	jasno-zielony	w gruncie / pod osłony	40x30	Bardzo smaczna, krucha
Kinga	50-55	-	***	**	***	>750	zielony	w gruncie / pod osłony	40x30	Bardzo smaczna
Kwiryna	45-50	**	***	-	***	>600	jasno-zielony	w gruncie / pod osłony	40x40	Bardzo smaczna
Ludwina	50-55	**	***	**	*	>600	jasnożółto-zielony	w gruncie / pod osłony	40x40	Odporna na wybijanie w pędy nasienne, nie gromadzi azotanów. Tolerancyjna na CMV
Salata rzymska										
Liwia	50-60	**	***	**	-	>750	zielony	w gruncie	60x40	Główka wydłużona, eliptyczna, bardzo krucha, soczysta, odporna na transport, nie gromadzi azotanów

* – przydatna ** – polecana *** – przeznaczona

(CMV) – Wirus mozaiki ogórka

(LMV) Wirus mozaiki sałaty

„Plantico - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice

tel. (22) 722 90 66; tel/fax (22) 722 95 53

e-mail: hurtownia@plantico.pl http://www.plantico.pl

Zakład Hodowlano - Nasienny Gołębiew,

Gołębiew Nowy 1, 99-300 Kutno, tel/fax. (24) 253 35 87

e-mail: sprzedaz@plantico.pl

Hurtownia Nasion Krzeszowice

ul. Legionów Polskich 21, 32-065 Krzeszowice, tel/fax (12) 282 50 56

e-mail: krzeszowice@plantico.pl