POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

Marchew | Carrot

Daucus carota L.

ODMIANY MIESZAŃCOWE / *HYBRID*

ALFA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 110-130 dni, typ Nantes
- Korzeń dł. 20-25 cm o gładkiej skórce, tępej nasadzie
- Przekrój korzenia jednolity, dobrze wybarwiony
- Wysoki plon handlowy
- Duża zawartość suchej masy, brak skłonności do pękania
- Polecana na świeży rynek, przechowywania i przetwórstwa

- *Vegetation period approx. 110-130 days, Nantes type*
- *Root with a smooth skin, blunt base, length 20-25 cm*
- *Uniform, well-coloured root cross-section*
- *High marketable yield*
- *High dry matter content, no tendency to cracking*
- *Recommended for the fresh market, storage and processing*

ASKONA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 130-150 dni, typ Berlicum
- Korzeń długi, o gładkiej skórce, lekko stożkowaty, tępo zakończony do półostrego
- Rdzeń średni do dużego, pomarańczowy, podobny do kory
- Wysoki plon handlowy
- Nie przejawia tendencji do pękania
- Przeznaczona głównie do przetwórstwa, zwłaszcza mrożenia

- *Vegetation period approx. 130-150 days, Berlicum type*
- *Long, smooth-skinned root, slightly conical, blunt to semi-pointed*
- *Core - medium to large*
- *Core and flesh have the same orange colour*
- *High marketable yield*
- *No tendency to cracking*
- *Recommended for processing, especially freezing*

BROKER mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 110-130 dni, typ Berlicum
- Korzeń walcowaty długości 18 cm, o masie około 180 g, intensywnie pomarańczowy
- Na przekroju całkowicie wybarwiony, nie kumulujący azotanów
- Zawartość suchej masy14%, cukrów 9%, karotenu 12 mg%
- Do bezpośredniego spożycia i przechowywania
- Zalecana uprawa na redlinach

- *Vegetation period approx. 110-130 days, Berlicum type*
- *Root is cylindrical, 18 cm long*
- *Average root weight 180 g*
- *Intensively orange, well coloured*
- *Very low content of nitrates*
- *Dry matter content 14 %, carbohydrates 9%, carotene 12 mg%*
- *For fresh market and storage*
- *Recommended for growing in ridges*

GALICJA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 110-120 dni, Nantes/Flakkee type
- Korzenie średniodługie, gładkie, kształt cylindryczny o tępym zakończeniu
- Barwa przekroju wyrównana, intensywnie pomarańczowa
- Wysoka zawartość suchej masy
- Mała skłonność do kumulowania azotanów
- Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa

- *Vegetation period approx. 110-120 days, Nantes/Flakkee type*
- *Medium-long, smooth, cylindrical roots with a blunt tip*
- *The colour of the cross-section is uniformly intense orange*
- *Dry matter content - high*
- *Tendency to accumulation of nitrates - low*
- *Recommended for fresh market, storage and processing*



KAMILA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 100-110 dni , typ Nantes
- Odmiana plenna, wyrównana
- Korzeń bardzo dobrze wybarwiony na zewnątrz i na przekroju
- Skórka bardzo gładka, łatwa do płukania
- Wysoka zawartość cukrów i karotenu
- Polecana na zbiór pęczkowy oraz do przetwórstwa

- *Vegetation period approx. 100 -110 days, Nantes type*
- *Fertile and uniform hybrid*
- *Root very well coloured on the outside and on the cross section*
- *The skin is very smooth, easy to rinse*
- *Sugar and carotene content - high*
- *Recommended for harvesting in bunches and processing*



KINGA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 105-120 dni, typ Nantes
- Odmiana plenna
- Korzeń cylindryczny do lekko stożkowatego
- Skórka intensywnie wybarwiona, gładka, błyszcząca
- Niska ten dencja do kumulowania azotanów
- Przeznaczona do bezpośredniego spożycia i do produkcji przetworów dla dzieci

- *Vegetation period approx. 105-120 days, Nantes type*
- *Fertile hybrid*
- *Root cylindrical to slightly conical*
- *The skin is intensely coloured, smooth and shiny*
- *Tendency to accumulation of nitrates - low*
- *Recommended for fresh market and for the production of baby foot*

KOMETA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 120-130 dni , typ Nantes
- Odmiana plenna
- Korzeń tępo zakończony, skórka gładka
- Ma wysoką zawartość suchej masy, karotenów
- Charakteryzuję się niską tendencją do kumulowania azotanów
- Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa

- *Vegetation period approx. 120-130 days, Nantes type*
- *Fertile hybrid*
- *Root is blunt, skin is smooth*
- *Content of dry matter, carotene - high*
- *Tendency to accumulation of nitrates - low*
- *Recommended for fresh market and for the production of baby foot*

KONGO mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 110-130 dni, typ Berlicum/Nantes
- Korzeń lekko stożkowaty, długości ok. 20 cm i masie 130-180 g
- Intensywnie pomarańczowy, na przekroju całkowicie wybarwiony
- Zawartość suchej masy 14%, cukrów 10%, karotenu 12 mg%
- Do bezpośredniego spożycia i przechowywania, polecana do przetwórstwa
- Zalecana uprawa na redlinach

- *Vegetation period approx. 120-130 days, Berlicum/Nantes type*
- *Slightly conical root, approx 20 cm long*
- *Average root weight 130-180 g*
- *Intensively orange, well coloured*
- *Dry matter content 14 %, carbohydrates 10 %, carotene 12 mg%*
- *For fresh market, storage and for processing*
- *Recommended for growing in ridges*

KRAKOWIA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 105-120 dni, typ Nantes
- Korzeń lekko stożkowaty, bardzo dobrze wybarwiony
- Skórka korzenia gładka
- Charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością karotenów i cukrów
- Przeznaczona na zbiór pęczkowy, do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa

- *Vegetation period approx. 105-120 days, Nantes type*
- *Slightly conical root, very well coloured*
- *The root skin is smooth*
- *It is characterized by a very high content of carotenes and sugars*
- *Recommended for harvesting in bunches, for fresh market and processing*

NEFRYT mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 110-130 dni, typ Berlicum/Nantes
- Przeznaczona na bezpośrednie zaopatrzenie rynku oraz do krótkotrwałego przechowywania.
- Barwa powierzchni korzenia i miąższu pomarańczowa.
- Korzeń dość długi, lekko stożkowaty, o gładkiej powierzchni.
- Brak skłonności do tworzenia zabarwienia antocyjanowego i zazielenienia główek.
- Miąższ soczysty, słodki, bardzo smaczny.
- Zalecany jak najwcześniejszy wysiew wiosną.
- Wysiew może być powtórzony do połowy lipca na zbiór jesienny.
- Gatunek wymaga gleb dobrze i głęboko uprawionych.

- *Vegetation period approx. 110-130 days, Berlicum/Nantes type*
- *For fresh market and short term storage*
- *Core and flesh - well coloured, orange*
- *Root is long, slightly conical, smooth*
- *Do not turn green, no anthocyanin colouring*
- *Juicy, sweet and very tasty*
- *Recommended for early spring sowing*
- *Sowing can be repeated until 15th of July for autumn harvest*
- *Recommended for growing in ridges*

NORTON mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 110-130 dni, typ Berlicum/Nantes
- Wytwarza walcowaty, zwężający się ku dołowi korzeń długości 21 cm, o masie około 160 g, intensywnie pomarańczowy, na przekroju całkowicie wybarwiony
- Zawartość suchej masy 13%, cukrów 10%, karotenu 11,7 mg%
- Przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia i przechowywania
- Polecana do przetwórstwa
- Zalecana uprawa na redlinach

- *Vegetation period approx. 110-130 days, Berlicum/Nantes type*
- *Root - cylindrical, narrowing at the end, 21 cm long*
- *Average root weight 160 g*
- *Intensively orange, well coloured*
- *For fresh market and storage*
- *Suitable for processing*
- *Recommended for growing in ridges*

OMEGA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 130-140 dni, typ Flakkee
- Długi korzeń, dobrze wybarwiony
- Wysoki potencjał plonotwórczy
- Duża zawartość suchej masy, dość wysoka zawartość cukrów
- Przeznaczona do przetwórstwa, polecana do bezpośredniego spożycia i przechowywania

- *Vegetation period approx. 130-140 days, Flakkee type*
- *Long root, well coloured*
- *High yield potential*
- *Dry matter content - high, sugar content - quite high*
- *Recommended for processing, fresh market and storage*

RODOS mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 110-130 dni, typ Berlicum
- Wytwarza walcowaty, zwężający się ku dołowi korzeń długości 19-20 cm, o masie około 200 g, intensywnie pomarańczowy, na przekroju całkowicie wybarwiony
- Zawartość suchej masy 12,8%, cukrów 9,5%, karotenu12,3 mg%
- Odmiana przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia i przechowywania
- Zalecana uprawa na redlinach

- *Vegetation period approx. 110-130 days, Berlicum type*
- *Root is cylindrical, narrowing at the end, 19-20 cm long*
- *Average root weight 200 g*
- *Intensively orange, well coloured*
- *Dry matter content 12,8 %, carbohydrates 9,5 %, carotene 12,3 mg%*
- *For fresh market and storage*
- *Recommended for growing in ridges*

RUMBA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 110-120 dni, typ Nantes
- Korzenie cylindryczne o tępym zakończeniu
- Gładka skorka, wyrównana barwa przekroju
- Mała skłonność do zazieleniania
- Długa, mocna nać o półwzniesionym pokroju pozwala na łatwy mechaniczny zbiór
- Przeznaczona do bezpośredniego spożycia

- *Vegetation period about 110-120 days, Nantes type*
- *Cylindrical roots with a blunt tip*
- *The root skin is smooth, a uniform colour of the cross-section*
- *Tendency to become green - little*
- *A long, strong leaves- easy for mechanical harvesting*
- *Recommended for fresh market*

SALSA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 130-150 dni, typ Flakkee
- Wysoki plon
- Korzeń lekko klinowaty, ostro zakończony, dobrze wybarwiony
- Skórka korzenia gładka
- Wysoka zawartość karotenów i suchej masy
- Przeznaczona do przechowywania i przetwórstwa, zwłaszcza na mrożonki, soki, susz

- *Vegetation period approx. 130-150 days, Flakkee type*
- *High yield*
- *Root slightly conical, pointed, well coloured*
- *The root skin is smooth*
- *Content of carotenes and dry matter - high*
- *Recommended for storage and processing, especially for frozen food, juices, dried products*

SAMBA mieszaniec F1

- Okres wegetacji 130-150 dni, typ Berlicum
- Korzeń lekko klinowaty i cylindryczny, tępo zakończony, dobrze wybarwiony
- Skórka korzenia gładka
- Bardzo wysoki plon, o bardzo dobrej strukturze
- Ma wysoką zawartość karotenów, suchej masy oraz bardzo dobry smak
- Przeznaczona do przechowywania i przetwórstwa, zwłaszcza na mrożonki, soki, susz

- *Vegetation period approx. 130-150 days, Berlicum type*
- *Root slightly wedge-shaped and cylindrical, blunt, well coloured*
- *The root skin is smooth*
- *Very high yield, with a very good structure*
- *Content of carotenes, dry matter – high. Very good taste*
- *Recommended for storage and processing, especially for frozen food, juices, dried products*

SPARTA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 140-150 dni, typ Flakkee
- Wysoki plon
- Korzenie długie, bardzo dobrze wybarwione
- Dość mały procentowy udział rdzenia w średnicy korzenia
- Duża zawartość suchej masy
- Smaczna, dosyć wysoka zawartość cukrów
- Przeznaczona do przetwórstwa, polecana do bezpośredniego spożycia i przechowywania

- *Vegetation period approx. 140-150 days, Flakkee type*
- *High yield*
- *Long, very well coloured roots*
- *Percentage of the core in the root diameter - small*
- *Dry matter content - high*
- *Tasty. Sugar content - quite high*
- *Recommended for processing, fresh market and storage*

ODMIANY USTALONE/*OPEN POLLINATED VARIETES*

BLANKA

- Okres wegetacji ok. 140-160 dni, typ Berlicum/ Flakkee
- Plenna, niezawodna w plonowaniu w różnych warunkach klimatycznych i glebowych
- Przeznaczona na bezpośrednie zaopatrzenie rynku, dla przetwórstwa (mrożonki, soki) oraz do długiego przechowywania
- Korzeń długi (25-28 cm), 160 -200 g, stożkowaty, ostro zakończony, bardzo duży, mało podatny na pękanie i rozwidlanie
- Skórka o pomarańczowej barwie
- Barwa kory i rdzenia wyrównana, kora gruba

- *Vegetation period approx. 140-160 days, Berlicum/Flakkee type*
- *High crops under different weather and soil conditions*
- *Recommended for fresh market, processing (juices) and for long storage*
- *Roots long (25-28 cm), very big (160-200 g) sharp ended, resistant to cracking*
- *Skin is orange coloured*

DELTA

- Okres wegetacji ok. 140-150 dni, typ Berlicum/Flakkee
- Wysokie, stabilne plonowanie
- Dobrze wybarwione korzenie
- Dość wysoka zawarość cukrów i suchej masy
- Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa

- *Vegetation period approx. 140-150 days, Berlicum/Flakkee type*
- *Stable high yielding*
- *Well-coloured roots*
- *Content of sugars and dry matter - quite high*
- *Recommended for fresh market, storage and processing*



DOLANKA

- Okres wegetacji ok. 140-150 dni
- Plenna odmiana w typie Flakkee
- Korzeń bardzo duży, dobrze wybarwiony, nie wykazujący skłonności do pękania
- Duża zawartość cukrów i suchej masy
- Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa

- *Vegetation period approx. 140-150 days*
- *Fertile variety, Flakkee type*
- *Very large root, well-coloured, no tendency to crack*
- *Sugar and dry matter content - high*
- *Recommended for fresh market, storage and processing*

FINEZJA

- Okres wegetacji ok. 120-130 dni
- Plenna, w typie Flakke
- Korzenie o kształcie lekko walcowatym do stożkowatego, dobrze wybarwione
- Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa

- *Vegetation period approx. 120-130 days*
- *Fertile variety Flakkee type*
- *Roots slightly cylindrical to conical in shape, well coloured*
- *Recommended for fresh market, storage and processing*



FLAKKESE 2-FLACORO POL

- Okres wegetacji ok. 140-160 dni
- Bardzo plenna odmiana w typie Flakkee
- Korzeń gładki, półostro zakończony
- Nadaje się na zbiór mechaniczny ze względu na silną nać i lekko wypukłą głowę
- Mała skłonność do pękania
- Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa

- *Vegetation period approx. 140-160 days*
- *Very fertile variety, Flakkee type*
- *Smooth, semi-pointed root*
- *Suitable for mechanical harvesting - strong leaves and slightly convex head*
- *Tendency to cracking - low*
- *Recommended for fresh market, storage and processing*

FLAKKESE 2-TROPHY ZIF

- Okres wegetacji ok. 140-165 dni, typ Flakkee
- Do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa (mrożonki, susz, soki) i przechowywania
- Kształt korzenia stożkowy, długi na 25-30 cm o średniej masie korzenia 200 g
- Korzenie nie posiadają skłonności do pękania i rozwidlania
- Niski wskaźnik wyrazistości rdzenia - około 1,3 (wyrównana barwa kory i rdzenia)
- Intensywność barwy kory i rdzenia - 7 (skala 1-9)
- Udział rdzenia do 50%
- Nać mocna, wysoka, odpowiednia do mechanicznego zbioru
- Tolerancyjna na porażenie przez alternariozę

- *Vegetation period approx. 140-160 days, Flakkee type*
- *For fresh market, processing (freezing, drying, juices) and storage*
- *Root is conical shaped, long (25-30 cm), 200 g weight*
- *Resistant to cracking*
- *Small core (less than 50%) and dark orange*
- *Strong leaves - good for mechanical harvesting*
- *Tolerant to Alternaria leaf blight*

FLAMANKA

- Okres wegetacji ok. 120-150 dni
- Bardzo plenna, w typie Flakke
- Długi, dobrze wybarwiony korzeń
- Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa

- *Vegetation period approx. 140-150 days*
- *Very fertile variety, Flakkee type*
- *Long, well-coloured root*
- *Recommended for fresh market, storage and processing*

JAGNA

- Okres wegetacji ok. 110-120 dni, typ Flakkee
- Korzenie długie 18-22 cm, lekko stożkowate, zakończenie zaokrąglone do półostrego
- Skórka gładka, pomarańczowa
- Rdzeń średni, intensywnie pomarańczowy
- Średnia masa korzenia 180-220 g
- Polecana głównie do uprawy na bezpośrednie spożycie
- Może być przechowywana do lutego

- *Vegetation period approx. 110-120 days, Flakkee type*
- *Long roots (18-22cm), slightly cylindrical, do not crack*
- *Smooth and orange skin*
- *Medium, dark orange core*
- *Root 180-220 g weight*
- *Recommended for fresh market*
- *Can be stored until February*

KORAL



- Okres wegetacji ok. 140-150 dni
- Bardzo plenna odmiana w typie Flakkee
- Korzeń o gładkiej skórce bez zazielenienia
- Kora i walec osiowy bardzo dobrze wybarwione
- Nadaje się do mechanicznego zbioru
- Polecana do przemysłu na soki i krajanki oraz do długiego przechowywania

- *Vegetation period approx. 140-150 days*
- *Very fertile variety, Flakkee type*
- *Root with a smooth skin without greening*
- *Very well coloured core and cortex*
- *Suitable for mechanical harvesting*
- *Recommended for the industry for juices and slices and for long storage*

NANTES 5- FANTA

- Okres wegetacji ok. 100-110 dni
- Bardzo plenna, w typie Nantes
- Korzeń długi, lekko stożkowaty do walcowatego
- Niewielka skłonność do pękania
- Brak tendencji do zazielenienia wewnętrznego i zewnętrznego
- Przeznaczona do przetwórstwa i na świeży rynek

- *Vegetation period approx. 100-110 days*
- *Very fertile, Nantes type*
- *Long, slightly conical to cylindrical root*
- *Tendency to crack - low*
- *No tendency to internal and external greening*
- *Recommended for processing and fresh market*

Marchew - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia / *Carrot - PlantiCo, Polan and Spójnia varieties*

Odmiana *Variety*	Marka *Brand*	Wegetacja (dni) *Vegetation period (days)*	Korzeń / *Root*							Przydatność do / *Recommended for*		
			Długość (cm) *Lenght (cm)*	Masa (g) *Weight (g)*	Kształt *Shape*	Miąższ / *Flesh*				Świeży rynek *Fresh market*	Przetwórstwo *Processing*	Przechowanie *Storage*
						Kolor *Color*	Skład chemiczny *Contents*					
							Cukry (%) *Sugar (%)*	Karoten (%) *Carotene (%)*	s.m. (%) *dry matter (%)*			
ODMIANY MIESZAŃCOWE / *HYBRID VARIETIES*												
ALFA F1	SPÓJNIA	110-130	20-25	150-160	N	pomarańcz. / *orange*	bd	bd	bd	***	**	*
ASKONA F1	POLAN	130-150	18-20	bd	B	pomarańcz. / *orange*	11,5	18,7	13,3	**	***	*
BROKER F1	PLANTICO	110-130	15-20	160-200	B	intens. pomarańcz. *intense orange*	9	12	14	***	**	***
GALICJA F1	POLAN	110-120	16-20	bd	N/F	pomarańcz. / *orange*	10	20	14	***	***	**
KAMILA F1	POLAN	100-110	18-20	bd	N	pomarańcz. / *orange*	6-8	16-18	13,5	***		
KINGA F1	POLAN	105-120	18-20	bd	N	ciemno pomarańcz. *dark orange*	8,4-8,6	19-22	16	*	**	**
KOMETA F1	POLAN	120-130	18-20	bd	N	ciemno pomarańcz. *dark orange*	8-8,4	17-19	16,8	***	**	**
KONGO F1	PLANTICO	110-130	18-22	130-180	B/N	intens. pomarańcz. *intense orange*	10	12	14	***	**	***
KRAKOWIA F1	POLAN	105-120	18-20	bd	N	pomarańcz. / *orange*	7,4-9	19-22	14-18	**	**	
NEFRYT F1	PLANTICO	110-130	17-22	120-160	B/N	intens. pomarańcz. *intense orange*	8	11,5	13,5	***	**	***
NORTON F1	PLANTICO	110-130	18-22	120-180	B/N	intens. pomarańcz. *intense orange*	10	11,7	13	***	**	***
OMEGA F1	SPÓJNIA	130-140	20-22	160-200	F	intens. pomarańcz. *intense orange*	bd	bd	bd	**	***	**

Odmiana *Variety*	Marka *Brand*	Wegetacja (dni) *Vegetation period (days)*	Korzeń / *Root*							Przydatność do / *Recommended for*		
			Długość (cm) *Lenght (cm)*	Masa (g) *Weight (g)*	Kształ *Shape*	Miąższ / *Flesh*				Świeży rynek *Fresh market*	Przetwórstwo *Processing*	Przechowanie *Storage*
						Kolor *Color*	Skład chemiczny *Contents*					
							Cukry (%) *Sugar (%)*	Karoten (%) *Carotene (%)*	s.m. (%) *dry matter (%)*			
ODMIANY MIESZAŃCOWE / *HYBRID VARIETIES*												
RODOS F1	PLANTICO	110-130	16-22	160-200	B	intens. pomarańcz. *intense orange*	9,5	12,3	12,8	***	**	***
RUMBA F1	POLAN	110-120	16-22	bd	N	pomarańcz. / *orange*	13,7	18	12	***	**	**
SALSA F1	POLAN	130-150	22-24	bd	F	ciemno pomarańcz. *dark orange*	10,5	19,6	15,5		***	**
SAMBA F1	POLAN	130-150	20-22	bd	B	pomarańcz. / *orange*	9,5	17,6	14,6		***	**
SPARTA F1	SPÓJNIA	140-150	18-20	160-190	F	intens. pomarańcz. *intense orange*	bd	bd	bd	**	***	**
ODMIANY USTALONE / *OPEN POLLINATED VARIETIES*												
AMSTERDAM 3 - AMSTERDAMSKA NOE	SPÓJNIA	100-110	12-16	bd	N	pomarańcz. / *orange*	bd	bd	bd	***	*	*
BERLIKUMER 2 - PERFEKCJA GOF	PLANTICO	120-150	16-19	220-240	B	ciemno pomarańcz. *dark orange*	8-8,5	16-19	11	***	*	***
BERLIKUMER 2 - BERŁO	SPÓJNIA	120-130	20-25	120-150	B	pomarańcz. / *orange*	bd	bd	bd	***	**	**
BLANKA	PLANTICO	140-160	25-28	160-200	B/F	pomarańcz. / *orange*	7,4	7,9	13	**	***	***
DELTA	SPÓJNIA	140-150	20-25	190-200	B/F	pomarańcz. / *orange*	bd	bd	bd	**	***	***
DOLANKA	POLAN	140-150	18-20	bd	F	pomarańcz. / *orange*	7,5-8	15-17	13,5-14	***	***	**
FATIMA	SPÓJNIA	140-150	20-25	200-210	F	pomarańcz. / *orange*	bd	bd	bd	***	***	**
FINEZJA	SPÓJNIA	120-130	18-22	180-200	F	pomarańcz. / *orange*	bd	bd	bd	***	***	***
FLAKKESE 2 - FLACORO POL	POLAN	140-160	20-24	bd	F	pomarańcz. / *orange*	7	9	12,5	**	**	***
FLAKKESE 2-TROPHY ZIF	PLANTICO	140-165	25-30	180-200	F	pomarańcz. / *orange*	7,4	7,9	13	**	***	***
FLAMANKA	SPÓJNIA	120-150	20-25	120-150	F	pomarańcz. / *orange*	bd	bd	bd	***	***	***
JAGNA	PLANTICO	110-120	18-22	180-220	F	pomarańcz. / *orange*	6,5	9	12	***	-	***
KORAL	POLAN	140-150	18-20	bd	F	ciemno pomarańcz. *dark orange*	7	12	12-14	***	***	***
NANTES 5- FANTA	SPÓJNIA	100-110	18-22	100-120	N	pomarańcz. / *orange*	bd	bd	bd	***	***	*
NANTEJSKA POLANA	POLAN	120-130	16-18	bd	N	ciemno pomarańcz. *dark orange*	7-9	9,5-10	14	***	**	**
REGULSKA	PLANTICO	130-140	16-21	220-240	B	intens. pomarańcz. *intense orange*	8,-8,8	16-18	12,5	***	***	***

bd - brak danych / no data

** nadaje się / useful ** polecana / recommended *** szczególnie polecana / specjally recommended*

Kształt korzenia: N – Nantes; B – Bericumer; F – Flakkee

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

Dział Handlowy w Zielonkach
tel. 22 722 95 53; **e-mail:** hurtownia@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:
tel. 12 623 38 40, 12 623 38 59, 12 623 38 68; **e-mail:** handel.krakow@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:
tel. 24 253 35 87; **e-mail:** sprzedaz@plantico.pl

Hurtownia Nasion Krzeszowice - Dział Handlowy:
tel. 12 282 50 56; **e-mail:** krzeszowice@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:
tel. 61 283 56 55; **e-mail:** handel.nochowo@plantico.pl

Hurtownia Nasion Rzeszów - Działa Handlowy:
tel. 17 861 14 58; **e-mail:** rzeszow@plantico.pl

Export – tel. 608-536-381; **e-mail:** trade@plantico.pl

www.nasiona.pl www.plantico.pl www.nasiona-warzyw.pl